



Olsztyn, dnia 04 listopada 2020 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W OLSZTYNIE

### **Hodowcy drobiu z terenu powiatu olsztyńskiego**

Nasz znak: PIW-Z-CHZ.85.td.1.2020

W związku ze stwierdzeniem nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Holandii i Niemiec (dzikie ptactwo), oraz na terenie Rosji i Kazachstanu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przypomina o podjęciu działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób (chów fermowy i przyzagrodowy), do zabezpieczenia przed przeniknięciem wirusa grypy ptaków oraz utrzymaniu na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

Grypa ptaków jest chorobą występującą u ptactwa dzikiego oraz domowego. Choć dzikie ptactwo wodne rzadko wykazuje oznaki choroby, to często przenosi wirus grypy do środowiska. Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczanie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia w handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu.

Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą, w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych.

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu, stosownie do specyfiki gospodarstwa, PLW w Olsztynie zaleca:

1. zabezpieczyć słomę oraz inne materiały stosowane do ścielenia obiektów, w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymanywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
2. przeprowadzać regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchody dzikich ptaków;
3. eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych i rur silosów paszowych);
4. w miarę możliwości nie tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) a istniejące zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
5. nie dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki) jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęściej usuwać opadłe owoce;
6. w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, wszelką obróbkę upolowanych zwierząt przeprowadzać w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież poddawać właściwym zabiegom higienicznym;
7. zaopatrzyć gospodarstwo utrzymujące drób w odpowiednie środki biobójcze (niszczące wirus grypy ptaków).

Jednocześnie PLW w Olsztynie przypomina o obowiązującym Rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).

Na terytorium Polski:

- zakazuje się:
  - a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,



b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

• nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

**W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu:**

- zwiększonej śmiertelności,
- spadku pobierania paszy i wody,
- nagłego spadku nieśności,
- objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów),
- czy innych niepokojących objawów,

**POSIADACZ DROBIU POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII LUB PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI Z ZAKRESU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ, URZĄD GMINY, MIASTA.**

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>

Załącznik:

1. Rozporządzenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).
2. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii,
3. Ulotka HPAI

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Olsztynie

*lek. wet. Mirosław Karczewski*



## **Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021**

2020-10-19

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego **ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków** w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: <https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks>). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzikich ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, **Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji** określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

- **zakazuje się:**

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

- **nakazuje się:**

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

- f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
- k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

**Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.**

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>